

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-57

GRANDES CULTURES
=====

N° 8 - 19 décembre 86

LUZERNE A GRAINES

(en collaboration avec la FNAMS et les SUAD
de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

DESHERBAGE DES CULTURES INSTALLÉES :

- C'EST LA PÉRIODE
- A FAIRE SOIGNEUSEMENT, EN BROYANT D'ABORD LA VÉGÉTATION

★ Les conséquences des mauvaises herbes peuvent être très graves :

- 1) pertes de rendements - jusqu'à 2-3 qx/ha (concurrence pour l'eau et les sels minéraux)
- 2) refus des lots par : - impossibilité de triage
- pourcentage excessif de graines indésirables
(Ray-Grass, Renouées, Ombellifères, Rumex) qui augmentent le pourcentage de déchets).

★ Désherber c'est choisir une spécialité en fonction :

- 1) des travaux culturaux et des dates de semis c'est à dire du DIAMÈTRE DES RACINES
 - supérieur à 8-10 mm (diamètre d'un crayon)
= culture bien développée bien installée
 - inférieur à 8-10 mm = culture peu développée
- 2) des adventices à détruire
 - avec les grands groupes : GRAMINEES - DICOTYLEDONES
 - qui sont peu ou très abondantes

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67.92.41.42

.../...



REPOS VEGETATIF			VEGETATION ACTIVE		SPECIALITES COMMERCIALES	GRAMINEES								DOSE/HA de p. com. en kg ou l.
DEC	JAN	FEV	POUSSES DE 5 cm	APRES PRECOUP.		graminées	chiendent	monn ois.	matricaire	veronique	helminthe	lateron	piss. plant	

1 - CULTURES BIEN INSTALLEES

DIAMETRE DES RACINES SUPERIEUR A 8-10 mm

					1 seul traitement **									
					Nomb SPEC.(diuron) + GRAMOXONE 2000 ou TOTACOL	●	△	●	●	○	○	△	△	2 + 2
						●	△	●	●	○	○	△	△	5
					2 traitements successifs **									
					diuron (déc.) puis VELPARS	●	△	●	●	●	●	●	△	2 puis 1
					SINBAR	●	△	●	●	●	△	△	△	0,8 à 1
					LEGURAME P.M.	●	○	○	△	△	△	△	△	3,5
					VEGEPRON DS (risques de jaunissement)	●	△	●	●	●	△	△	△	6 à 8
					dans les 48h. risques phytotoxicité VELPAR S **	○	△	●	●	●	●	●	○	1
					FERVIN + HUILE 11.	●	●	△	△	△	△	△	△	1 (à 3*)
					FUSILADE + AGRAL 0,5 l.	●	●	△	△	△	△	△	△	1,5 (à 3*)

2 - CULTURES PEU DEVELOPPEES (semis sous-couvert ptps 85 ou autom 85)

DIAMETRE DES RACINES INFERIEUR A 8 mm

					KERB ULTRA + GRAMOXONE 2000	●	○	●	△	●	△	△	△	1,5 + 2
					KERB ULTRA (seul)	●	○	●	△	●	△	△	△	1,5
					LEGURAME P.M.	●	○	○	△	△	△	△	△	3,5

3 - TRAITEMENTS SPECIFIQUES

	RUMEX (Rosette → début montaison).	ASULOX												4
	CUSCUTE (sur tâches au démarrage)	DACTHAL W 75 + REGLONE 2												6 + 2

- Efficacité satisfaisante
- Efficacité moyenne
- △ Efficacité insuffisante

* dose efficace contre chiendent rampant

** pour cultures très sales